

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二十一

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣梁鳴岐

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十一 明

周王朱橚撰

婦人諸疾門

淋瀝 附論

夫婦人淋者由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎為表裏俱主於水行於脬者為小便也臟腑不調為邪所乘腎虛則小便數膀胱熱則小便澀其狀小便疼痛澀數淋瀝不宣故謂之淋也小便不通脹滿氣喘急用藥無疑

方

木通散 治婦人五淋

木通 榆白皮 瞿麥穗 大麻仁

滑石 各一兩 貝齒 葵子 白茅根 各二兩

甘草 半兩

右為粗末每服五錢水煎空心服

葵根散 治婦人五淋澀痛

葵子 一兩 車前子 二兩 亂髮灰 半兩 甘草 半兩 炙 微赤判

川大黃

一兩剉
微炒

桂心

一兩

滑石

二兩

冬瓜穰

二兩
乾者

木通

二兩
剉

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓食前溫服

葵子散 治婦人五淋小便澁腹痛悶

石韋

去毛

王不留行

滑石

當歸

剉微炒

瞿麥

赤芍藥

琥珀

甘草

炙微赤剉
各一兩

右為細散每服食前以麥粥飲調下二錢

琥珀散 治婦人勞淋小便澀痛

琥珀

石韋

去毛

滑石

葵子

瞿麥

各一兩

當歸

剉微炒

赤芍藥

木通

各半兩

右為細散每服食前以葱白湯調下二錢

王不留行散 治婦人勞冷淋小腹結痛

王不留行

一兩

當歸

三分剉微炒

亂髮灰

半兩

葵子

三分

車前子

三分

鯉魚齒

一兩細剉

赤芍藥

三分

枳實

半兩熬
炒微黃

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

赤茯苓散 治婦人氣淋冷小便澀

赤茯苓

葵根

桂心

石韋

赤芍藥

琥珀

水通

判各
一兩

青橘皮

三分湯浸
去白穰焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白二

莖煎至六分去滓食前溫服

蜂房散 治婦人五淋小便澀痛不通

露蜂房灰

白茅根

葵子

亂髮灰

車前子

滑石

各一兩

右為細散食前以燈心湯調下一錢

滑石散 治婦人熱淋

滑石

一兩

車前子

瞿麥

各三分

海蛤

茅根

葵子

各三分

右為細散入研了藥令勻每服食前以燈心葱白湯

調下二錢

貝齒散 治婦人結熱成淋小便引痛或時溺血如小豆

汁

貝齒

葵子

三分

石燕

滑石

各三兩

右為細散研過食前以葱白湯調下二錢

治婦人血淋及尿血澁痛

亂髮

一兩

牛耳中毛

半兩

右同燒為灰細研每服食前以溫酒調下半錢

金沙散 治淋

海金沙草

陰乾

右為末煎生甘草湯調二錢甚者不過三四服

又方

用真琥珀研細不以多少研麝香白湯調下

治婦人淋病

白朮

二兩炒令黃色
去節最細者炒

右為細末每服五錢用石韋葉煎湯下

治婦人諸般淋

右用苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合

用水五鍾煎至一中盞濾去滓用麝乳香少許研調

下勒縣式尉耿夢得其內人患沙石淋十三年每旋痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝有聲百般

不效偶得此方服之一夕而愈目所視也

治小便淋瀝

用琥珀為細末每服三錢濃煎葱白湯調下

出瑞竹堂方

治婦人淋

右自取甲燒灰以水調服一作酒服

石韋散 治婦人小便卒淋瀝

石韋

黃芩

木通

榆白皮

葵子

瞿麥穗

甘草

右等分為粗末每半兩水一盞半薑三片煎至七分去滓熱服一方食前

生液湯 治小便秘澀淋血

蒲黃

炒一兩

木通

黃芩

各二兩

瞿麥

滑石

半兩

甘草

二錢半炒

右㕮咀每服二錢水一盞煎至七分溫服之

鷄蘇散 治婦人血淋

鷄蘇葉

木通

各二兩

生乾地黄

滑石

各三兩

刺薊

一兩

右為粗末每服半兩水一盞淡竹葉三七片煎至七分去滓食前溫服

治婦人血淋及尿血澁痛

生乾地黄

兩三鬱金

蒲黃

兩各二

右為細末每服二錢車前子葉煎湯調下日三服以

愈為度

桃膠散 治婦人氣淋勞淋

桃膠

榆白皮

兩各一

車前子

冬瓜子

鯉魚齒

葵子

瞿麥

木通

兩各半

枳殼

分一

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服一方
無葵子有生薑半分葱白二莖同煎食前分二服
法製香附子 治諸血淋瀝婦人崩漏及產後水瀉

大香附子

杵去
毛皮

右以童子小便浸一宿細截碎又用米醋蘸過焙乾
研為末每服二錢米飲調下治冷帶用炒艾葉煎湯
調下

香附子丸 治婦人淋瀝崩血

淨香附

各半兩酒浸煮受焙

右為末黃稗米糊丸如梧桐子大每服五十丸米湯

下

楮實子丸 治婦人憂思傷脾不能化水所以湛濁或

下赤白淋瀝不乾平臍益氣血

川牛膝

二兩酒浸焙乾

川草薢

一兩

楮實子

三兩焙

山藥

白薑

炮

川芎

各一兩

一方加附子鹿角霜

各一兩

右為末用大北棗蒸去皮取肉研為膏同丸如桐子
大每服四十九空心米飲下蜜丸亦可

分清丸散 治婦人經後不調湛濁淋瀝男子治濁亦
可

益智仁 川草薢 石菖蒲 白茯苓

烏藥 各一兩 甘草 四錢

右咬咀每服三錢鹽一捻同煎服

斷下丸 治婦人血氣虛弱漏下五色淋瀝不斷

白龍骨

乾薑

白茯苓

牡蠣

伏龍肝

黃耆

厚朴

烏梅肉

黃牛角腮

燒灰

海螵蛸

赤石脂

醋浸炒研各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十丸霜梅湯下

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飲每發欲死食不生肌面目萎黃

貝齒

四枚炒作灰

葵子

一升

石膏

五兩

滑石

三兩末

右以水七升煮四物取二升去滓內末煉猪脂一合

更煎三沸分三服日三不瘥再合服一方加阿膠搗炒

小便出血

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通經絡環臟腹血性得寒則凝澁得熱則流散失其常經溢滲入於脬內故小便血也

方

茜根散 治婦人小便出血心神煩悶

茜根

當歸

剉微炒

甘草

炙微剉

貝母

煨微黃

丹皮

瓜蒂

羚羊角屑

各一兩

栢葉

微炙一兩

紅藍花

二兩

生乾地黄

三兩

右為末每服三錢以水一鍾煎至五分去滓食前溫服

鹿茸散

出聖惠方

治婦人勞損虛羸尿血

鹿茸

當歸

熟乾地黄

葵子

蒲黃

續斷

等分

右為末酒調二錢日三服

當歸散

出聖惠方

治婦人小便出血或時尿血

龍骨

黃芩

當歸

劉微炒

生乾地黄

茜根

各三分

右為細散每服煎青竹茹湯調下二錢日三四服

龍骨散

出聖惠方

治婦人尿血不止

羚羊角散

龍骨

當歸

當歸蒲

各一兩

生乾地黄

二兩

右為細末粥飲調下二錢食前服

當歸散

出聖惠方

治婦人小便出血或時尿血

當歸

羚羊角屑

赤芍藥

各半兩

生地黃

二兩

刺薊葉

三分

右粗末每服三錢水煎去滓服

生乾地黃

出聖惠方

治婦人尿血不止

生乾地黃

三兩

栢葉

黃芩

各半兩

阿膠

炒成珠一兩

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓

溫服

牡蠣粉

車前子

桂心

黃芩

各半兩

右為細末每服以粥飲下二錢日三四服

治婦人無故尿血

出聖惠方

桂心

鹿角屑

大豆黃卷

各一兩

右治下篩酒服方寸匕日三

大黃散

出聖惠方

治婦人卒傷熱尿血

川大黃

半兩剉微炒

川芒硝

半兩

蒲黃

三分

右為細末食前以冷水調下二錢

治婦人無故小便出血

出聖惠方

甜瓜子

微炒

重葉

蜀葵花

各一兩

右為細末每服濃煎木通燈心湯半瓊入童子小便一合調下二錢日三服或四服

治婦人小便出血不止

出聖惠方

馬兜鈴根

刺薊根

各一兩

右為細散每服食前當歸酒調下二錢

膏髮煎

出大全良方

治婦人穀氣實胃氣下泄食入即嘔

陰中出血

頭髮灰

猪脂

右調停綿裹如棗核大納之有效

髮灰散

出聖惠方

治小便尿血或先尿而後血或先血而

後尿亦遠近之謂也又治飲食忍小便或走馬房勞

皆致乳轉臍下急痛不通兼治肺疽心衄內崩吐血

一兩口或舌出血如針孔若鼻衄咬肉立已亦治久

痢不安下血成片

亂髮灰

本草云能療瘰癧血通開膈利水道破癥瘕消癰腫治尸症雜瘡及腠轉利大小便止

效嗽

鼻衄

右一味用二錢以米醋二合湯少許調服并華水調亦可服藥訖即炒黑豆葉蹲其上則通瘡癰之毒以溫酒空心服

治婦人小便出血或時尿血

出聖惠方

生地黃

右搗取汁每服一小盞日三服

又方

出聖惠方

右蒲黃末酒調二錢服之或水調服

又方

出聖惠方

鹿角膠

三兩炙令黃

右用水二大瓊煎至半瓊去滓分為三服食前服

治卒傷於熱尿血

右人忽小便後出鮮血數點不勝驚駭却全不疼如

是一月若不飲酒則血少終不能止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂呼之來供一器汁云是草藥添少蜜以水兩服而愈既厚酬之遂詢其藥名乃鏡面草一名螺靨草其色青翠所在石階縫中有之

治婦人常無故尿血

出聖惠方

右龍骨以一二兩酒調方寸七空心日三服久者二

十服愈

治婦人無故尿血

出本草

胡鷺窠中草

燒末

右用酒服半錢亦治丈夫

又方

出千金方

取夫瓜甲燒作灰酒服之

又方

出聖惠方

右鹿葱濃煎作湯每服一小錢日三四服

又方

出聖惠方

右以律草搗絞取汁每服一小錢日三四服

又方

出聖惠方

棘刺

一兩剉

右以水二大盞煎至一大盞分為二服食前溫服

治婦人無故尿血及遺尿不知時出

出千金方

右取故船上竹茹曝乾搗末酒服方寸七日三服

治婦人無故尿血

出千金方

爪甲

亂髮

右並燒末等分酒服方寸日三飲服亦得

治尿血并五淋砂石疼痛不可忍

出永類
鈴方

人參

黃耆

各一兩

百合

半兩
蒸

飛羅麩

一兩

右為末煎白茆根湯調并治咳血

又方

出永類
鈴方

治淋而出血片痛甚

以空心鹽湯下鷄蘇丸收效此方有理

治婦人無故遺血溺

出本
草

書中白衣魚三十箇內陰中

衣魚今人呼為蠹
魚在衣書中出也

小便不通

附論

大小便秘者腎與膀胱俱主水行於小腸傳於胞中滲入胞內而為溲溺二經若内生熱於小腸傳於胞中故膀胱熱則小便不利成淋瀝之症若小便腸腹急滿而緊痛者胞轉也但生津液和氣而自愈妊娠小便淋瀝者名曰子淋產後小便不利者因津液竭血氣虛熱於膀胱或小便澀秘而難也宜與生液湯治之血弱者為經絡勞傷氣血弱澆入膀胱故血隨下宜服生液湯

方

葵子散

出聖惠方

治婦人小便不通及大便難

葵子

車前子

川大黃

剉微炒

冬瓜仁

當歸

已上各三分

木通

半兩剉

滑石

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前

溫服

榆皮

出聖惠方

治婦人小便不通小腹疼痛

榆白皮

剉

木通

剉

赤芍藥

猪苓

去黑皮

滑石

各三分

葵子

黃芩

各半兩

右為細散食前以木通湯調下二錢

四七湯

出瑞草堂方

治婦人女子小便不順甚者陰戶疼

痛

半夏

一兩湯泡七次

厚朴

薑製

赤茯苓

各五錢

紫蘇葉

二錢

甘草

二錢

香附子

五錢

右為咀咀分作四服每服水二盞生薑五片煎至七分

去滓加琥珀末一錢調服

木通散

出聖惠方

治婦人小便不通

木通

三分

車前子

甘草

各半兩炙微赤剉

葵根

三分

瞿麥

半兩

滑石

一兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食前

溫服

治婦人卒小便不通

出聖惠方

陰地草

一兩燒灰

滑石

半兩

葵子

一兩

右為細散每服於前食以葱湯調服一二錢

治婦人惡小便不得依時而起致令胞轉經四五日困

篤欲死

出聖惠方

滑石

二兩

亂髮灰

一兩

右研停取桃白皮一斤熟搗以水三盞絞取汁無時

溫半盞調二錢服

治婦人卒小便不通

出聖惠方

杏仁

七枚炒令黑色

滑石

一分

右研為末以熱酒調頓服之立通

治婦人小便不通或急欲悶死

鹽二斤

右搗碎熱熬令熱布裹熨臍下按小便漸漸令出不
住按熨以通快即止

又方

右以濕生蟲十七枚爛研新汲水調頓服之立通

又方

右用車前子二兩為末食以井華水調下二錢

治婦人小便不通

用亂髮如拳大燒灰細研以溫酒下二錢立通

治婦人不得小便

用杏仁七粒去皮尖麪炒黃為末水調服立通

又方

用紫苑末并花水調服取三指撮立通又云紫花皆

可用

治小便不通 曾有一婦人患此諸醫通用淋閉藥者

無非逆滑之劑並無效驗忽遇一醫士診視云左右
手尺脈皆沉而微其證乃陰虛小便難故也遂用大
附子一箇八錢重去皮臍炮熟放鹽水內浸良久同
不蛀澤瀉八錢重合作三服每服用燈心七莖煎服
隨通而愈

治婦人卒不得小便

出大全
良方

右用紫苑末以井花水服三捻小便血服五捻
止凡用紫苑去蘆頭去土了用東流水淘洗令淨用

蜜浸一宿至明於火上焙乾用

葵根斂子

出聖惠方

治婦人小便不通

葵根

二兩

滑石

紫葛

剉

瞿麥

各半兩

白茅根

三分

右剉細和勻每服半兩以水一大盞入葱白五寸煎至五分去滓每於食前溫服

大府丹 治心經熱小便澀兼治五淋

生乾地黄

木通

黃芩

各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大木通煎湯三十丸
此藥治淋瀝臍下滿痛許學士云一卒病渴日飲水
一斗不食者三月心中煩悶時已十月予謂心經有
伏熱與此藥數服越二日渴止又飲食如故此本治
淋用以治渴可謂通變也

葱白湯

出大全
良方

治卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘并膀胱或從憂驚氣無所伸鬱
閉而不流氣衝脬系不正診其脈右澁小左手急大

橘皮

三兩

葵子

三兩

葱白

一莖

右咬咀水五升煮取二升分三服

禹餘糧丸 治便澁疼痛

右用餘糧不以多少為末以麩糊為丸如梧桐子大
每服五十丸木通湯下

血分椒仁丸

出永類
鈴方

治婦人腫滿小便不通由經血

不通遂化為水乃審氣脈虛實

椒仁

甘遂

續隨子

郁李仁

黑牽牛

五靈脂

碎炒

當歸

吳茱萸

延胡索

各半兩

芫花

醋浸一宿炒黃

石膏

各一分

信硫

膽礬

各一錢

斑蝥糯米

炒黃去米

芫青

各三十枚去頭足翅糯米炒黃

右為末麪糊丸芫豆大每服一九橘皮湯下

脬轉

附論

夫婦人脬轉之病者由過飽所迫或忍小便俱令水氣還迫於脬積聚不得流通外水應入不得入內洩應出不得出內外壅滯滿不通故為脬轉其症小腹急痛不

得小便甚者至死不可救也

方

亂髮散

出聖惠方

治婦人忍小便不得時起致令脬轉經

四五日困篤欲死宜服此

亂髮

一斤燒灰

滑石

三兩

鯉魚齒

一兩

右為細末散不計時候以溫水調下二錢

治婦人過忍小便致脬轉

出聖惠方

右以車前子一斤切水七升煮至三升去滓每於食

前溫一中錢服

又方

右用浮華草二兩乾者水煎至三升去滓每於食前溫一中錢服湯下一錢亦通小便利流腫

又方

右自取爪甲燒灰細研水調服之

又方

右以梁上塵研令極細水調一錢服之

滑石散 治婦人丈夫脬轉小便數日不通

滑石一兩

寒水石一兩

葵子一合

右為末以水一斗煮取五升時時服一升即利一方

局方八味丸尤佳

又方

亂髮燒灰

葵子

車前子

右等分為末每服二錢茶湯調下

蒲葉散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子

裹茶弱葉

燒灰
一兩

滑石

研細
半兩

右研停沸湯調二錢服

石韋湯 治脬轉小便不通

石韋

去毛

車前子

右等分為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服
八味丸 治婦人病飲加渴煩熱不得卧而反倚息以

脬系轉戾不得溺故致此病名轉脬但利小便則愈

以此藥有茯苓

故也一名
腎氣丸

熟地黄

八兩

山藥

茱萸

去核各四兩

附子

炮

桂心

各二兩

牡丹皮

去心

茯苓

去皮

澤瀉

各三兩

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

治婦人過忍小便致脬轉不得溺

用滑石末葱湯或葱酒調下二錢七服下

小便數

附論

夫婦人小便數者由腎與膀胱俱住於水腎氣通於陰
此二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便數也

方

鹿茸丸 治婦人久積虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸

去毛塗酥
炙微黃

椒紅

微炒

桂心

附子

炮製去皮
臍各一兩

牡蠣

燒微粉
一兩

桑螵蛸

三分
微炒

補骨脂

一作骨
碎補

石斛

去根
剉

沉香

肉從蓉

三分酒洗去
皺皮微炙

鷄臍脰

微炙已上
各一兩

右為細散酒煮麴糊和丸如梧桐子大每服食前以

溫酒下二十九

鹿茸丸 治婦人久虛冷小便日夜三五十行腎與膀胱

二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便數

鹿茸

烏賊骨

桑寄生

各一兩

龍骨

各一兩

白芍藥

當歸

附子

各三分

桑螵蛸

半兩

右為細末食前溫酒調下二錢服

鷄臍散 治婦人小便數

鷄臍

十貝微炒

桑螵蛸

半兩微炙

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

菰蔞

一兩判

當歸

一兩炙微赤判

熟乾地黄

一兩

甘草

一兩炙
微赤剉

沉香

肉蓯蓉

二分酒洗
去皺微炙

鷄肫脰

微炙已上
各一兩

右為細散末煮麪糊和丸如梧桐子大每服食前以

溫酒下三十丸

鹿茸散 治婦人久虛冷小便日夜三五十行腎與膀胱

二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便數

鹿茸

烏賊骨

桑寄生

龍骨

各一兩

白芍藥 當歸

附子

三分

桑螵蛸

半兩

右為細末食前溫酒調一二錢服

鷄臍散 治婦人小便數

鷄臍脰

十具
微炙

桑螵蛸

半兩
微炙

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

菝葜

一兩
剉

當歸

一兩炙
微赤剉

熟乾地黄

一兩

甘草

一兩炙
微赤剉

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓食前溫服

菝葜散 治婦人虛冷小便滑數

菰菰

剉

桑螵蛸

微炒

附子

炮製去皮臍

龍骨

各二兩

韭子

羊兩
微炒

桂心

半兩

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

牡蠣散 治婦人臟腑久冷小便滑數

牡蠣

二兩燒為粉

龍骨

一兩

鷄肫胫

十片微炙

吳茱萸

一分湯浸七遍焙乾微炒

附子

一兩炮製去皮臍

鹿角屑

一兩炒黃

右為細散每服食前以溫酒調下一錢七

桑螵蛸 治婦人虛冷小便數

桑螵蛸

三十枝炒

鹿茸

牡蠣粉

甘草

二兩

黃耆

半兩

右咬咀每服三錢水一錢煎至七分熱服

四倍湯 治小便頻數

人參

牡蠣

半兩鹽泥煨

赤石脂

一兩醋浸七次

菖蒲

三兩

右為細末煎薑湯調下一錢服

龍骨丸 治婦人小便滑數

龍骨

二兩
煨過

鹿茸

去毛塗醋
炙微黃

椒紅

微炒

附子

炮製去皮
臍各一兩

右為細散以酒煮麴糊丸如梧桐子大每服食前溫酒下二十九

又方

右用鹿角屑炒令黃擣為細散每服食前溫酒調下二錢

又方

右雞肫胗微炒搗為細散每服食前以溫酒下一錢

遺失不禁

夫膀胱不利而又有時致遺尿者乃心腎之氣傳送失度之所為也故有小便溢而遺者有遺而不自知者有婦人產後調理不慎致傷膀胱遺尿無時者又有脬寒臍冷而遺尿不禁者

方

治婦人遺尿不知出時

白薇

白芍藥

等分

右為末酒服方寸七日三服空心

又方

白礬

牡蠣等分

右為細末飲服方寸七亦能療丈夫遺尿一方酒服

又方

右用桑螵蛸酒炒為細末每服二錢生薑湯調下一

方食前服之一用米飲調服

療婦人小便不禁下血

用雄鷄拔領翎燒灰為末酒服方寸七

治婦人遺尿不知出時

右敗船茹為末酒調服三錢

又方

用胡燕窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方

用遺尿人下卧薦草燒灰服之瘥

大便不通

夫婦人大便不通者由五臟不調冷熱之氣結於臟胃則津液燥竭大腸壅滯大便不通也 仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也 初虞世云余歷觀古人用通藥率用降氣等藥蓋肺氣不下降則大腸不能傳送以杏仁枳殼訶子等藥是也又老人虛人風人津液少大便秘經云澀者滑之故用胡麻杏仁麻子仁阿膠之類是也 今人學不師古妄意斟酌每至大便秘燥即駛藥蕩滌之大耗津液氣血非不暫效旋更秘澀

兼生它病昔有人始病風淫末疾為醫者以駛藥屢利
之後為肺痿咯膿血卒至大便不通所以古人服藥尤
謹重不若今人之輕生故舉此以戒後人 經云春復
於風夏必食飧泄蓋木氣刑上土不能滲泄則木氣勝
故泄風行津液燥故秘即不可專以秘燥為風也昔有
人年七十日下利十行百方治之不愈又若腰脚拘攣
醫者以痢醋棗仁治拘攣而利愈又有人秘結以前藥
投之而大便秘故知秘與利比出於風也

方

調氣丸 治婦人大便不通

檳榔

羌活

桂心

芎藭

木香

等分

郁李仁

湯浸去皮微炒

川大黃

剉微炒

牽牛子

羊生半炒熟

青橘皮

湯浸去白穰焙各一兩

右搗羅為散煉蜜搗五七百杵丸如梧桐子大空心

以溫生薑湯下三十丸

大五朮丸

主臟氣不調大便難通榮衛利九竅進飲

食

大黃

斗米下
搗勻焙

枳殼

去穰
麴炒

白芍藥

葶藶

炒香
別研

牛脂

菴蓉

酒浸軟溫水洗
切焙各一兩

桃仁

百枚

杏仁

四十枚並去皮
尖麴炒黃別研

右除有油藥並為末煉蜜丸入牛脂桃仁杏仁葶

藶杵數十下丸如梧桐子大米飲下三丸日三服腹

稍空時服未知稍增以知為度

牽牛子散 治婦人大便不通

木香

半兩

郁李仁

去皮微炒

青皮

去白

木通

枳殼

去白麪炒

桂心

各一兩

黑牽牛

三兩半生半炒

右為細末每服二錢如煎茶一沸攪起方溫空心服

郁李仁散 治婦人大便不通搜風轉氣

郁李仁

二兩湯浸去皮微炒

牽牛子

一兩微炒

神麪

微炒

桂心

木香

青橘皮

湯浸去白穰焙

檳榔

各半兩

右為細散空心以薑茶調下二錢

通神散 治婦人大便不通熱而實者方可投此藥其

證心腹脹痛食不得進心胃煩悶六脈沉滑而實是其證也

大黃

芒硝

檳榔

桃花

郁李仁

湯浸去皮
微炒各一兩

木香

右為細末每服二錢空心粥飲調下

木香丸 治婦人氣壅大腸秘澁宣轉

木香

川大黃

剉微炒

桂心

檳榔

青橘皮

湯浸去白穰
焙各一兩

巴豆

半兩去皮心用新
汲水浸三日後微

炙炒令黃研
紙裹壓去油

右為末入巴豆研令勻用麪糊丸粟米大每服以溫水下七丸

大麻仁丸 治婦人腸胃風結大便常秘

大麻仁 去殼秤別
研如膏 大黃 各二
兩炒 檳榔 木香

枳壳 各一
兩

右為細末與麻仁研停煉蜜丸如梧桐子大空心溫水下每服二十丸

調導飲 治婦人產前後風秘大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼

製各四分

甘草

炙二分

右細剉每服三錢食前薑棗煎服忌動風物

二仁丸

杏仁

去皮尖麩炒黃

麻仁

別研

枳殼

去穰麩炒赤

訶子

火炮搥去核

右二物各一兩為細末同二仁杵煉蜜和杵丸如桐

子大溫水下三十丸未效稍增

潤腸丸 治大腸結澀

麻黃

炒半兩

枳殼

炒半兩

大黃

蒸

香

一兩

右為末煉蜜丸如梧桐大每服三十丸食前芝麻湯下此藥常服滋潤大腸通利燥澀大便悶者三焦不順五腸不和風之結腸胃津液枯燥大腸壅滯所以不利大便同也產後更衣難香腸本大熱又因水窄無俱津液暴竭腸胃熱澀故便閉潤腸丸主之

潞公盛夏間苦大腑不調醫官李琬即以赤石脂龍

骨乾薑等藥饋公服之因不大便者累曰具熱辨甚
苦公又不喜服大黃藥予告曰此燥在直腸藥所不
及調以蜜導之公為然作蜜兌是夕三用藥下結糞
四五十枚大如胡桃色黑如橡栗公二三日間飲食
如故蓋世有一種虛人不可服利藥今載其法

大棗湯 治婦人腸燥悲傷欲哭家若神靈數次有此

主之一名小麥湯

甘草二兩

小麥一升

大棗十枚

右咬咀以水六升煮取三升去滓分服亦補脾氣轉
治婦人一名甘草湯 士夫程虎卿內人姪娘四五
箇月遇晝則慘慙悲傷淚下數次如有所憑醫與巫
者兼治無益有人以此證告之管先生伯說記先生
曾說此證名曰腸燥悲傷非大棗湯不愈虎卿對證
治藥一枚而愈矣古人識病製方種種妙絕如此試
而後知

芫花丸 治婦人便秘澀

芫花

半兩醋拌炒令乾

青橘皮

半兩湯浸去皮白穰焙

川大黃

三分剉微

炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大食前以生薑湯下十丸

玄豆丸 治婦人夾宿食大便不通

玄豆

一分炙令焦去皮子

巴豆

五枚去皮心紙裹壓去油

香墨

二錢

右為細末入巴豆研令勻以醋煮麴糊和丸如梧桐子大每服一丸嚼乾柿裹以溫水下

治風入脚氣人大便或秘或利虛人老人方

一名皂莢丸

皂莢子

三百枚破作片子慢火炒燥甚即入醋裏大又炒燥又入酥至焦黑為末

右煉蜜丸

如梧桐子大每服三十丸煎療酸棗仁湯

下空心服兩時久未利再進一服漸加至百丸不妨以通為度

疾藜湯

疾藜不以多少炒至赤黑色臼內以水棒舂去揀
簸淨每服疾藜三兩以酸棗仁一兩炒令香用杵為

末馬尾羅筋每三錢水一錢煎至七分去滓溫服下
前九子藥

蜜兌方

好蜜四五兩銀石器中微火熬不住手以匙攪候可
丸見風硬即以蛎蛤再作

治婦人臍燥自笑哭

用棗燒灰存性米湯燕下無時候

粉塗手捏作人狀長三寸許廁上內之以手掩定大

便通放手未扶

牽牛丸 治婦人大便不通心腹虛脹

黑牽牛

二兩生

青皮

去白一兩

木香

半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫水下每服二

十丸

葱白湯 治婦人裏急不已方

阿膠

葱白

等分

右以水煎溫服不以時立效

痔
附論

夫婦人痔瘻者皆由酒色氣風食及勞傷經絡其血滲而成之亦有長年久坐而成者其痔有五種肛邊瘡如乳出於外時出膿血者為牡痔也肛邊腫生瘡而出血者為牝痔也肛邊生瘡痒而復痛者為脈痔也肛邊腫核痛發寒熱而出血者為腸痔也因便轉而清血隨出者為血痔也

方

槐耳丸 治婦人久痔下膿血不止

槐耳

微炒

牛角鯁

炙令黃

禹餘糧

燒醋滓二遍各二兩

猪懸蹄甲

十枚炙焦黃

麝香

一分研

白欬

黃耆

剉

艾葉

微炒

蒲黃

白馬蹄

酒煮一宿令炙黃

續斷

當歸

剉微炒

熟乾地黄

鰻鱺魚頭

炙微黃

蝟皮

炙令黃焦已上各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以粥飲下

三十丸

龜甲散 治婦人痔肛門腫痛下血

龜甲

二兩炙微黃

磁石

搗碎水飛過

敗舩茹

亂髮灰

當歸

剉微黃

赤芍藥

木賊

延胡索

桑耳

黃耆

剉

白朮

細研碎水飛過已上各一兩

麝香

二分細研

右為細散每服食前以粥飲調下二錢

拘腸丸 治諸般疼疾肛邊腫痒或生痛膿血或下血

腸出不入有效此方不可亂傳

白礬

綠礬

各五錢

訶子

十枚

枳殼

五錢

白附子

十箇

天南星

五錢

半夏

三錢

瓜蒌

三錢

蝟皮

十箇

胡桃仁

十箇

雞冠花

空心服之

右十一味醋煮麪糊為丸每服二三十丸用酒吞下

槐子仁散 治婦人痔疾肛門痒痛下血不止

槐子

一兩半
微炒

當實

蝟皮

炙令
黃色

桑耳

木賊

黃耆

剉

當歸

剉
微炒

烏賊魚骨

各一兩

皂莢子

半兩微炒

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

麝香

半分研入

右為細散入研了藥令勻每服食前以荊芥湯調下

二錢

蝟皮散 治婦人久痔下膿血疼痛腫悶

蝟皮

炙令黃斷

續斷

槐子

微炒

連翹

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮製到

黃耆

到

當歸

剉微汁浸

白礬

熟乾地黄

各一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服於食前煎桑根白皮湯下三十丸

硫黃丸 治婦人痔疾久不止臟腑虛冷面色萎黃食

少無力

硫黃

研細

白礬灰

蛻皮

炙令黃

槿藤子

去殼微炒

附子

炮製去皮臍

當歸

劉微炒

木香

已上一各一兩

猪牙皂莢

半兩炙焦

烏賊魚骨

右為細末以酒煮麴糊和丸如梧桐子大每服煎生

薑湯下二十丸

皂莢刺丸 治婦人痔疾久不止

皂莢刺

一兩炒
令黃

野狸頭

一枚炒
令黃

蝟皮

一片炙
燒灰

烏蛇肉

一兩酒拌
炒令黃

槐子仁

一兩
微炒

槀藤子

一兩去
殼微炒

麒麟竭

半兩

麝香

一分

右為末以麪糊和丸如梧桐子大每服食前以當歸

湯下二十丸

鼈甲散 治婦人五種痔疾

鼈甲

露蜂房

蛇蛻

蝟皮

猪後懸蹄甲

五味炙存
性各二兩

麝香

一分

右各研為細末和藥合停每服一錢空心用生薑地黃煎湯調下肛門有竅腫痛傳之即愈忌生菜

穿山甲散

出聖惠方

治婦人痔疾

穿山甲

一兩炙
黃色

槭藤子

一兩去
殼微炒

麒麟竭

半兩

露蜂房

半兩
微炒

蝟皮

一兩炙
令黃色

麝香

一分

右為細散入研了藥令勻每服食前以當歸湯調下

一錢

蜜陀丸 治婦人痔疾面色痿黃

蜜陀僧

一兩燒令赤

白礬灰

一兩

槐子仁

半兩微炒

皂莢灰

一分 雞冠花

半兩

百草霜

半兩

右為細散以麪糊和丸如梧桐子大每服食前以栢

葉湯下一十九

枳殼散

出聖惠方

治婦人痔疾痒痛不可忍宜熨

枳殼

二兩

木香

半兩

鬼箭羽

二兩

鬼白

一兩

槐子仁

一兩

右藥麤搗以慢火炒令熟用青絹包裹看冷熱慰之

黃蘗散

出聖惠方

治婦人痔疾

黃蘗

一枚

白礬

二兩

蛭皮

一片

右藥都入甕瓶內益口以炭火漸煨令通赤候冷取

出細研每服食前以枳殼湯調下二錢

黑龍丸

出聖惠方

治婦人痔疾下血疼痛不可忍

黑龍尾煤

亂髮灰

神麴

微炒已上各一兩

右為末以棗肉和丸如梧桐子大每服食前以枳殼湯下二十九

露蜂房散

出聖惠方

治婦人五痔有頭出膿血不止宜傳

露蜂房

半兩剪碎微炒

蛻皮

一兩燒灰

麝香

一兩

右同研令細旋取滲於痔頭上

白礬丸

出聖惠方

治婦人痔疾久不差

白礬灰

附子

炮製去皮臍為末各二兩

右研令細勻以湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每服荆

芥湯下二十九日三服一方蜜和丸酒服

治婦人久痛心焦多怒遂成痔疾狀如蓮子熱腫而痛

出大全
良方

右用熊膽入梅花腦子研更有猪膽汁調開塗痔立

愈

療痔熱腫痛

出大全
良方

蛭蚰大者一條

江西名蛭蚰湖北名石
莢子廣州名鼻涕虫

右研令爛入研了龍腦一字坯子半錢研令停傳之

愈先以石薤荔煮水重洗尤妙

腸風下血

附論

夫婦人臟腑損傷風邪易入凡熱氣在內令人下血氣在內亦大便血色或如小豆汁腹中疼痛有先便後下血者血來遠先下血後便者血來近遠近者言病在上焦下焦也婦人面色血氣時寒時熱脈浮弱按之絕者為下血也

方

艾葉丸

出聖惠方

治婦人肚腹裏滿臍下疔痛大便下血

不止

艾葉

一兩微炒

鼈甲

一兩半塗醋炙令黃去裙襴

當歸

一兩對微炒

白龍骨

二兩

附子

一兩炮裂去臍皮

乾薑

一兩炮裂對

赤芍藥

三分

卷栢

一兩半

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大食前以

粥飲下三十丸

桑耳散

出聖惠方

治婦人大便下血小腹中切痛不止

桑耳

微炒

牡蠣粉

龍骨

當歸

劉微炒

白芍藥

各一兩

黃芩

甘草

各半兩炙微赤劉

右為細散食前以粥飲調下二錢

烏賊魚骨丸

出聖惠方

治婦人下血或似小豆汁

烏賊魚骨

一兩

芎藭

三分

熟乾地黄

一兩半

茜根

一兩

當歸

一兩劉微炒

白芍藥

三分

阿膠

二兩搗碎炒令黃焦

右為末煉蜜和搗三五杵丸如梧桐子大食前粥飲

下三十丸

側柏散 治婦人大便後下血不止

側柏

一兩
微炒

龍骨

二兩

鹿角膠

搗碎炒
令黃色

熟乾地黄

木香

當歸

剉微炒
令黃色

右為細散食前以粥飲調下二錢

阿膠丸

出聖
惠方

治婦人大便後下血不止

阿膠

一兩搗碎
炒令黃色

烏賊魚骨

白芍藥

各二兩

當歸

一兩剉
微炒

劉寄奴

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前以

粥飲下二十丸

烏龍丸

出聖惠方

治婦人大便後下血不止腹內疼痛

烏龍尾煤

伏龍肝

香墨

當歸

剉微炒各一兩

皂莢子仁

羊兩微炒

右為末以麴糊和丸如梧桐子大每服食前以生薑

艾葉煎湯下二十丸

腸風黑散

出永類鈴方

治榮衛氣虛邪冷進龍襲腸腑之內

或食生冷或啖炙煖或飲酒過度積熱腸間致使脾胃虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛門脫出或久患酒痢大便頻併並皆治之

敗棕

燒

木饅頭

燒

烏梅

去核

粉草

炙各等分

右為細末每服二錢水一盞煎至七分空心溫服
僕常治一婦人便血不止用煮附圓加五靈脂效

防風如神散

出大全良方

治婦人風虛大便後時時下血

防風

枳殼

等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心服

治婦人大便下卒血不止

出聖惠方

巴豆

一枚炒灰

亂髮

如鷄子大燒灰

右細研以酒三合調頻服之

治腸風下血

出大全良方

枳殼

十五合每合入巴豆三枚去殼皮安在綿纏之用好米醋酒於砂盆內煮候醋乾更加無

灰酒煮令糜爛去巴豆研成膏

右以黃耆五兩為末入膏內為丸如梧桐子大每服

二十丸空心米飲

吞下酒亦可

治臟風

出聖惠方

右以蒼朮不以多少以皂角濃按汁浸一夕次日煮
令水乾焙焦為末麪糊和丸如梧桐子大米飲空心
下五十丸日三服

治婦人大便卒下血不止

出聖惠方

右以豉一升水三大錢煮取一盞去滓分三服一日

溫溫服盡

荊芥穗散

出大全良方

治婦人風虛大便後時時下血宜

服

荊芥穗

黃耆

熟地黄

桑耳

地榆

槲白皮

皂角刺

乾薑

槐豆

牛旁子

當歸

甘草

右等分為細末每服二錢粥飲調下空心服

木香烏荊丸

出大全良方

治腸風酒痢

木香

分一

荊芥穗

川烏

炮各一兩

右為末酒糊如梧桐子大每服二十九食前臨卧濃

煎粟根白皮酒吞下忌羊血

地榆湯

出大全良方

經云結陰者便血一升再結者二升

三結者三升

地榆

四兩

甘草

一兩

縮砂仁

四十枚

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分滓去淨空心

服

艾薑湯

出直指方

治大便秘下膿血

艾葉

一握

黑豆

百粒

右新水一大盞煎至六分入生薑汁三大匙稍熱服

又方

出直指方

黃連

二錢

南木香

一錢

右剉細慢火煎食前服

治腸風下血

出大全良方

赤芍藥

一兩五上燒存性

右為細末溫酒下二錢

脫肛附論

夫肛門者大腸候也大腸虛冷其氣下衝肛門反出亦有產後因用力努軀氣衝其肛亦令反出也

方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得

出大全良方

右蝸牛一兩去殼生研以豬脂和傅之立愈藥性論曰蝸牛有小毒能治大腸脫肛范旺方云此螺全似蝸牛色黃而小雨後好綠桑葉者佳孫真人同

姚和衆方

出大全良方

治男子婦人小兒大腸虛冷肛門

脫出

右以鐵精粉傅之良聖惠方亦治陰脫陰腫

集驗方

出大全良方

治療脫肛歷年不愈

右以生鐵三斤水一斗煮取五升去鐵以汁洗日再

姚和衆方

出大全良方

治大人小兒因痢脫肛亦治產後

陰下脫

右以用鰲頭骨燒灰研取粉撲之日華子云頭燒灰

療脫肛圖經同藥性論鼈頭血塗肛脫一方并花水調服

孫真人方

出大全良方

治療脫肛腸頭若挺出一片

右蝦蟆皮瓶中燒烟燠功效

泄瀉

夫婦人泄瀉者經中所謂洞泄殄泄溏泄濡泄胃泄大瘕泄大腸泄小腸泄水穀注下其實一也原疾之由皆因腸胃虛冷而邪氣乘之經云寒甚則泄春傷於風夏

必飧泄蓋風傷肝肝正旺而移氣尅於脾故寒即溏熱則垢此得於外也喜怒憂思致使腸氣膈絕精神奪散心致澹泄此屬內也如飲食生冷食傷脾胃而泄者屬不內外也寒者溫之熱者涼之滑者澀之溫者燥之治痢之法無以過也

方

木香散

出大全良方

治臟腑冷極久傷冷慙吸瘡下泄米

穀不化飲食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛

冷下泄及一切水瀉冷痢

木香

破故紙

炒各一兩

良薑

宿砂仁

厚朴

製各一兩

赤芍藥

橘紅

桂心

白朮

各半兩

胡椒

吳茱萸

湯炮七次各一兩

肉豆蔻

四箇 檳榔

一箇

右為散每服三錢用不浸水猪肝四兩許出筋膜批為薄片重重搥藥置一鼎中入漿水一椀醋一茶腳許蓋覆煮肝熟入鹽一錢葱白三莖細切生薑彈子

許拍破同煮水欲盡空心作一頓食之初服微瀉不防亦是逐下冷氣少許自止經年冷痢滑瀉只是一服渴即飲粥湯忌生冷油膩物如不能食冷物即添少漿暖服嘉興謝醫得此方惡其繁只用漿煮猪肝丸如梧桐子大粥飲下五十丸其效亦然暴瀉痢只是一服唯熱痢瀉不治 大全良方云趙府博豆人病泄瀉不止服附子木香訶子肉豆蔻等藥及諸丹皆無效召僕診之肝腎脉虛弱此肝腎虛也府博云

見在何經僕曰論泄痢止言脾胃病風冷溫毒之所
侵及飲食傷滯腸虛則泄痢而不知肝腎氣虛亦能
為洩痢古書所載不可不辨經云洩不止腎虛也只
曰諸厥固泄皆屬於下謂下焦肝腎之氣也門戶束
要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故
下焦不能禁固泄痢腎為胃關門戶不束要故食廩
不藏若病泄痢其源或出於此若專以脾胃藥治之
則謬固千里矣遂服木香散數服而愈

桂香丸

出大全良方

治腸腑虛為風寒濕所搏冷滑注下

不禁老人虛人免篤累效

附子

肉豆蔻

白茯苓

各一兩

桂心

木香

炮

白薑

炮各半兩

丁香

一分

右為細米糊丸如梧桐子大空心米飲下五十丸

豆蔻分氣飲

出求類鈴方

治臟腑虛寒泄無度及婦人產

洞泄危篤甚

藿香葉

草豆蔻仁

炮

青橘皮

各四兩

甘草

丁香

各半兩

烏梅

五十箇

肉豆蔻

右咬咀每服四錢水二盞糯米一撮煎至七分去滓

溫服之

香朴丸

出大全良方

治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣

閉不進飲食

大厚朴

五兩

北茴香

白朮

陳皮

各三兩

訶子

赤石脂

各兩半

右為細末麪糊丸如梧桐子大空心米飲下五十九丸

如常服暖脾胃

豆蔻丸

出大全良方

治腸寒泄瀉不止服諸藥無效亦可

治男子

右用肉豆蔻麪裹煨香不以多少研細入陳米白飯搗令得所丸如菜豆大空心煮粟米飲吞下百丸即效

胃苓散

出大全良方

治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄

瀉不止亦治男子

右合和五苓散平胃散薑棗煎空心服

五香散

出大全良方

治食魚傷泄瀉不止氣刺下衝及婦

人產前後腹痛血氣奔疾用溫酒一產後則血衝心
用敗蒲煎湯下如安胎以糯米飲下孕婦脾泄瀉痢
煎陳米飲調下食

烏藥

白芷

炒

枳殼

白朮

炒

良薑

甘草

莢茂

有莢者減半

右等分為細末每服二錢溫酒調下

人參豆蔻散 治久瀉不止諸藥無效僕累試之有效

人參 豆蔻 乾薑 厚朴 甘草

陳橘皮

各一兩

川芎

桂心

訶子

北茴香

各半兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎至六分服之

普賢丸 治大便溏泄者脾氣薄胃氣弱水穀不能消飲食不能化腸胃虛則下為陰泄產後泄者緣體虛

起早冒觸寒邪留注大腸則自刺凡病溏泄者普賢丸主之

龍骨

煨

黃連

茱萸

蓬朮

各等分同炒
色變為度

右為細末丸如梧桐子大每服五十丸空心石菖蒲湯下

神木丸 治春傷於風下生飧泄大治傷風頭項皆拘急鼻流清涕

蒼朮

一斤

藁本

細辛

一斤
六錢

川芎

各六
兩

獨活

四兩

粉草

二兩六錢

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分出汗
加葱去滓稍熱服無時候

下痢

附論

夫赤白痢者古人名之滯下是也究病原皆因外感五
邪之氣內傷生硬冷熱之食其證不一有赤有白有赤
白相雜有冷有熱有虛有實大抵四時皆以胃氣為本
未有不因外感寒暑寒濕風之氣而傷於脾胃既虧而

又內傷飲食飲食不能尅化到今令積滯而云無積成
滯下古人不成痢者此也經云春傷於風夏必飧泄蓋
風喜傷脾然春時肝木正旺而不受邪反移氣尅於脾
土然脾既受尅又不能忌慎口腹恣飧生冷粘硬之物
到今脾不能尅化積滯又秋夏之間或再感暑只吞冷
之氣發動而成痢也路必先臍腹疼痛洞泄水瀉裏急
後重或有或無或赤或白或赤白相雜日夜無度有如
此證不問冷熱虛實但當先神木散可以發散風邪冷

溫之氣次服五苓散分利水穀兼用如以感應丸溫脾
去積滯再服六神丸未有不安者也或曰雖古人有言無
積不成痢專以去積為先豈有一歲積獨於夏秋之間
人皆有痰而吞冬無益風邪入胃木夾勝土不為暴不
則痢疾其神術散要藥也又有一坊一郡之內上下傳
染疾狀相似或則是有一家長幼皆然或上下隣里間
相傳染或有病同而證異而治因或用溫劑而安或用
涼而安或用涼藥而愈如此等是毒疫利毒痢者雖當

五運六氣之相勝亦不犯可泥此等是毒一運起相勝
豈獨偏於一方一郡而獨於一家二家者乎如此證當
先察其虛實冷熱者以敗毒散多加人參甘草陳米薑
棗煎服其三黃熟艾湯黃連阿膠丸五苓散駐車丸可
選而用之如下痢赤多或純下鮮血裏急後重大便不
通身體狀熱手足心熱大煩燥渴腹脇脹痛小便赤色
六脈洪大或緊而數或沉而實此熱痢也宜白頭翁湯
三黃熟艾湯五苓散可選用之若風痢下血大過宜用

胃風湯加木香黑豆煎服若秋夏之間下痢或赤或白或赤白相雜臍腹疼痛裏急後重增寒發熱飽煩悶燥渴引飲嘔逆惡心小便不利及五心煩熱六脈虛弱此等脈證正因伏暑而得此疾宜服香薷散如黃連甘草當歸酒水濃煎沉今水冷頓服兼服酒煮黃連丸或小柴胡湯加人參煎服必愈如雜證一退而痢尚未止則以四物湯加膠艾煎服以調陰陽未有不安者也水穀不分小便不利宜用五苓散淡竹葉煎湯調服如煩燥

甚者亦宜服之若不明伏者之證但以脈虛而妄投梔
附薑桂丹石之藥而殺人深可嘆息若下痢絕白狀如
魚腦臍腹冷痛日夜無度手足逆冷或有嘔逆全不入
飲食欲溫而惡冷六脈微細此由腸腑虛冷之故宜木
香散加服四味理中湯及鍾乳健脾丸甚者四肢逆冷
六脈沉絕當一味酺補兼灸氣海丹田二穴更以助胃
之藥此守而不攻之意也宜四順附子湯三建丹白丹
加味參附湯薑附湯皆可選用如年尊虛弱之人或素

來稟受怯弱亦宜此法斟酌調理然大宜開胃進食為
先食可得入則脾運也便聚糟粕既成垢膩鮮血瘀滯
不患其禍矣如久痢不瘥腸滑洩不止諸藥不效方可
施之澁腸前劑止之臍亦宜先以龍虎骨肉豆蔻損胃
氣如少壯之人健壯者服之間奏其效若是疫毒受暑
溫之證及年尊之人或素怯受弱服此莫不受其大害
以固秘澁腸為先則風寒暑濕之邪惟澁而不去而胃
脘閉而不通禁口不食日見羸瘦糟粕不入腸中所患

無由可除矣若有此證宜以參苓散四君子湯加以石蓮山藥之劑治之秘愈治病欲求補藥有溫通之意在焉知四君子湯理中十全湯加白豆蔻茯苓官桂草厚朴之屬可以散風邪可以分水道可以開胃脘可以治纏擾可以通祕澀此攻守之意兩全也大抵治病之法虛者補之實者訶子鍾乳胡粉之藥近人多用鶯粟殼扣掄之屬然此物惟太緊澀能者瀉之滑者澀之閉者通之有積者推之風則散之暑則滌之溫則燥之熱則

冷之涼則溫之熱則調之以平為期不可以過此大法也下痢者脾胃虛寒腸腑怯弱飲食不得和水穀不能養故少力減食腸痛妊娠下痢者冷熱相乘陰陽相激腹痛而痢產後者胃脘與臟怯故寒熱之邪物為攻傳於血海則痢多搏於腹胃則痢當血邪氣相攻則痢雜色不止小便紅如雜痢與龍骨丸治之

方

麥香散 治男子婦人小兒陰陽不和冷熱相搏積而

成痢或赤或白赤白相雜日夜無度裏急後重臍腹疼痛甚不可忍又治水瀉腸鳴腸痛或熱毒中傷或寒氣久積並宜治之

罌粟殼

製

陳皮

去白

粉草

各一兩

厚朴

青皮

白薑

各一分

右為細末每服二錢赤痢甘草湯調白痢陳米飲調赤白相雜紫蘇湯調如冷瀉陳米飲調熱瀉新井水調空心服此藥正脾去積和氣暖中忌生冷肥膩油麪

醃醃

黃芩湯 治乾嘔下痢

黃芩

人參

乾薑

各三分

木棗

十二枚

半夏

半兩

右以水七升溫煮取三升溫分三服

四順附子湯

附子

生去蘆朮

白薑

炮

甘草

人參

各一兩

右㕮咀每服四錢重水二盞煎至七分去滓空心服

吐瀉腹痛加桂半兩小便不利者加茯苓半兩久
痢疾雖體寒手足逆冷令汗自出六脈沉伏不宜輕
用附子多因伏暑而得此疾亦有汗自出四肢逆冷
六脈虛弱但背寒面垢如塗油齒乾煩冤燥渴引飲
此伏暑證也柴胡湯五苓散酒蒸黃連丸必能奏效
一方四順湯

治

治吐瀉赤白疾

陳皮

黃連

七錢

木香

五錢

右件剉作二服赤加烏豆一錢半白加乾薑一錢半

赤白同加煎服

四味阿膠丸 治熱痢

黃連

赤茯苓

二兩

芍藥

三兩

阿膠

炒炮一兩

右將三味為末却以好醋熬阿膠成稀膏丸如梧桐

子大米飲下三十丸

白頭翁湯 治熱痢連月下血不瘥

白頭翁

二兩

黃連

黃蘗皮

秦皮

各三兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓無時候溫服一方加甘草阿膠各二兩

鷓鴣粟散

治產前產後痢不問赤白

嬰女粟殼

十枚去絲穰

陳木香

一塊如小錢大

橘皮

一枚去穰

右剉粗末用水一椀半煎至一椀溫服

玉粉丹

治熱痢

蛤粉

硫黃

各等分

右同研細白麵糊和丸如梧桐子大每飲下五十丸
豆蔻餅 治赤白痢臍腹刺痛久而不愈大治冷痢

櫻栗殼

製一兩

白芍藥

黃耆

各三錢

陳皮

青皮

木香

可子

肉豆蔻

人參

各一錢半

羌活

當歸

各一錢

右為末煉蜜丸如彈子大每服二丸水一錢煎至七分溫服大全良方云有一婦人病痢日四十日服諸藥不愈當診之六脈沉弱大凡下痢之脈宜沉弱但

服十全大補湯薑棗煎成加白蜜半匙同煎數沸服之則愈甲子夏秋間趙經畧姪孫成九九歲患痢疾甚重召小方脈未得至逆診之大卒細以觀之云是血痢其實非也只是血水而已曰記調中湯治法云治夏月初秋或有暴寒折於盛熱結於四肢則伏熱頭痛寒傷於胃則下痢或水或赤或白伏熱寒閉脈類遂無大黃服之而愈

調中湯

葛根

黃芩

芍藥

桔梗

赤茯苓

白朮

甘草

炙

藁本

各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服移時再服能大霍亂吐和腹痛手足逆冷脈微欲絕

三建丹

陽起石

煨飛半兩

鍾乳粉

一兩

大附子

炮取末半兩入藥一半作糊

右用附子糊丸如梧桐子大每服五丸至十丸空心溫酒下如渴人參湯下

加味參附湯

大附子

二兩
半炮

右咬咀每服四錢重水二錢薑十片丁香十五粒米
一撮煎至七分空心服

香茸丸 治下危困

麝香

羊錢別研
臨時入

鹿茸

一兩去毛酥炙黃
為末入射香攪勻

右以燈心煮棗肉為丸如梧桐子大每服五十丸空
心服凡痢疾不問赤白而為冷熱之證若手足煖則

為陽只須服五苓散用粟米飲調下次服感應丸二十丸若覺手足厥冷則為陰當服已寒丸附子之類若有人夏月患疾一日六七十行用五苓散兩服止昔有醫者每料漆滴乳香半兩尤有效紹興人苦疾多往往而死凡平時所治痢如櫻粟之類不可向口惟服此等藥成浮石員效

蒲黃散 治婦人胎前產後赤白痢

生薑自然汁

年少者十兩年老二十兩

鴨子

一箇打碎入姜汁攪勻

右煎至八分入蒲黃三錢煎至五七沸空心溫服效
紫參湯 治下痢肺痛

紫參

半斤

甘草

三兩

右以水五升先煮紫參取二升內甘草

煮取一升半
溫分三服

治痢下不止方

右用水煮木香丸却以多年白梅三十二箇燒灰存
性為細末陳米飲調下三五服

訶梨勒散 治氣痢

右以訶梨勒十枚為散粥飲和頻服

良方云昔一婦人泄瀉不止似痢非痢似血非血其色如濁酒診之則六脈沉絕醫用熱藥及服之則發煩悶遂先用敗毒散數服加陳米煎次用胃風湯粟米煎服即愈調中湯去大黃療此證亦愈

六神丸 治赤白痢疾

茯苓

枳殼

麥芽

木香

白痢
焙之

神麴

切作末
留為糊

黃連

六味等分
赤痢倍之

右為末用神麴末作糊為丸如梧桐子大每服五十丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾薑甘草湯下大全良方云此藥有黃連可以解暑毒清腑厚腸胃有木香能溫脾逐邪氣上下痢有枳殼能寬腸胃有茯苓能利水道有神麴麥芽可以消食此痢中之要藥也

小紅丸 治久痢下血不止

赤石脂

一兩醋
泡七次

乾薑

一兩
炮

棗

三兩

艾葉

製一兩

川椒

七錢半合
炒火氣用

烏梅

一兩
去皮

右為末以小棗蒸爛研如泥絞藥末為丸如桐子大
每服五十丸空心米飲湯送下

龍骨丸

治下痢不止

黃連

慢火
炒

乾薑

炮

當歸

各半兩酒
浸煮乾

赤石脂

醋煨
七次

阿膠

二錢半炮
蛤粉炒

右為末醋糊和丸如桐子大每服五十丸空心烏梅
湯下

治禁口痢

右用石蓮肉不以多少不炒去殼將肉并心研為細末每服二錢陳米飲調下便覺思食此疾蓋毒氣上衝華蓋心氣不通所以不入食服此藥之後心氣痢當頓下而愈未愈自服痢藥

又方

右用乾山藥不以多少半生半炒黃為細末米飲調下此證乃痢毒上沖華蓋心氣不通故禁口不食服

二味心氣通痢當頓下一方四君子湯加二味陳倉
米煎甚妙矣

治乳婦赤白下痢及冷洩久滑

出本草

以猪子肝一葉薄批之訶子末搥著微火炙又搥炙
盡末半兩止空心細嚼陳米飲送下

普濟方卷三百二十一